Des chercheurs du CEA, du CNRS et de l'Université Aix-Marseille [1], en collaboration avec [2], AGERIS [3], ont mis en lumière une grande diversité de

La radiorésistance est présente chez des organismes aussi différents que les bactéries, les archéobactéries, les eucaryotes

Une équipe américaine [4] a obtenu en 2014, par évolution dirigée [5], des bactéries *Escherichia coli* r

Radiorésistance de Deinococcus : quelle est son origine ?

La radiorésistance chez D. radiodurans résulte d'une combinaison de conditions physiologiques particu

Au-delà de l'espèce modèle *D. radiodurans*, de nombreuses espèces de *Deinococcus* radiorés

Les auteurs de ces travaux ont alors passé en revue tous les mécanismes et facteurs impliqués dans l

[1] Le Gray (Gy) est l'unité de dose absorbée. Elle permet d'exprimer l'énergie massique reçue sous fo

[2] L'équipe de Michael Cox, à Madison (USA) et ses collaborateurs

[3] L'évolution dirigée consiste dans ce cas en des irradiations répétées avec des doses sub-létales. L

[4] Au sein du BIAM, l'Institut de biosciences et biotechnologies d'Aix-Marseille (CEA/CNRS/Université

[5] Institut de recherche coréen pour l'énergie atomique

Références : Sangyong Lim, Jong-Hyun Jung, Laurence Blanchard and Alan de Groot **Conservation and Diversity of**
10.1093/femsre/fuy037