

[Contraceptifs oraux combinés \(COC\) et risque de thrombose veineuse : Préférer les pilules de deuxième génération contenant du lévonorgestrel - Lettre aux professionnels de santé](#) 

*Information destinée aux médecins généralistes, médecins gynécologues et sage-femmes*

**L'ANSM souhaite rappeler aux prescripteurs, afin de minimiser le risque de thrombose lié aux Contraceptifs oraux combinés (COC), qu'il soit veineux ou artériel, de :**

**- de privilégier la prescription des COC de deuxième génération contenant du lévonorgestrel- de rechercher les facteurs de risque, notamment de thrombose, lors de toute prescription d'un COC à une nouvelle utilisatrice- d'informer les femmes du risque de thrombose et les alerter quant aux signes cliniques évocateurs- d'effectuer un suivi clinique pour surveiller la tolérance au traitement contraceptif prescrit.**

- Contraceptifs oraux combinés (COC) et risque de thrombose veineuse : Préférer les pilules de deuxième génération contenant du lévonorgestrel - Lettre aux professionnels de santé (21/12/2012) (68 ko)

#### **Lire aussi**

- Contraceptifs oraux combinés et risque de thrombose veineuse : prescription des pilules de 2e génération contenant du lévonorgestrel en première intention - Point d'information (01/10/2012)