



La Haute Autorité de Santé précise la prise en charge échocardiographique des personnes exposées au benfluorex

Écrit par HAS

Jeudi, 10 Mars 2011 21:56 - Mis à jour Jeudi, 10 Mars 2011 22:04

L'échocardiographie Doppler transthoracique est indiquée dans le cadre du suivi des patients exposés au x produi
ts contenant du
benfluorex

-

Mediator
et ses génériques

. S

aisie

par l

e

Ministère

du Travail, de l'Emploi et

de

la Santé

,

l

a Haute Autorité

de Santé publie une fiche de bon usage

sur

cet examen

,

à destination des professionnels de santé sollicités par des
personnes

exposées au benfluorex

.

En cas de suspicion clinique, de doute d'atteinte valvulaire ou sur demande des personnes exposées au benfluorex, une écho

cardio
graphie
Doppler transthoracique
sera
réalisée
en consultation spécialisée de cardiologie
pour caractériser la présence d'une fuite valvulaire.
Pour déployer
leurs
recommandations, l'A
gence
française de
sécurité sanitaire
des
produits de
santé
et
la Direction
générale de la santé ont diffusé, l
e 28 février dernier,
une information à l'ensemble d
es
cardiologues
sur l
a prise en charge médicale des
personnes exposées au
benfluor
ex et
présentant
donc
un risque de valvulop
athie
ou d'hypertension artérielle pulmonaire.

Dans la continuité de cette information, la Haute Autorité de Santé diffuse aujourd'hui les modalités de suivi par échocardiographie Doppler transthoracique dans une fiche de bon usage et a mis à jour son rapport d'évaluation de 2009 sur cet examen. Ces documents doivent permettre d'apporter aux cardiologues une information homogène, pratique et pédagogique et constituent également un complément d'information pour les autres médecins, dont les médecins traitants qui prescrivent cet examen et voient en consultation des personnes exposées et inquiètes.

Les documents publiés aujourd'hui et diffusés notamment aux cardiologues via le Conseil National Professionnel de Cardiologie précisent les signes écho cardio graphiques à rechercher

p

Echocardiographique des personnes exposées au benfluorex

Écrit par HAS

Jeudi, 10 Mars 2011 21:56 - Mis à jour Jeudi, 10 Mars 2011 22:04

pour établir le diagnostic de valvulopathie. Ils déterminent également la fréquence de suivi de la pathologie.

Cette fiche sera diffusée aux autres professionnels impliqués dans la prise en charge de
s personnes
exposées au benfluorex
(médecin généraliste, endocrinologue, pneumologue...).

Pour consulter les documents sur l'échocardiographie Doppler transthoracique dans le suivi des personnes exposées au benfluorex

,

[cliquez ici](#)

.