Consommation des benzodiazépines : Bien respecter les règles de bon usage pour limiter les risques dont celui de démence **L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) vient d'analyser à nouveau l'existence d'un lien entre la consommation de benzodiazépines et le risque de démence, dont la maladie d'Alzheimer.**

- Consommation des benzodiazépines : Bien respecter les règles de bon usage pour limiter les risques dont celui de démence - Point d'information (17/12/2012) (135 ko)

Lire aussi

- Etude « Benzodem » : Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ (17/12/2012) (532 ko) - (2012)
- Rapport d'expertise de l'Agence : Etat des lieux de la consommation des benzodiazépines en France - (Janvier 2012)
- Point d'information relatif au plan d'actions de l'ANSM visant à réduire le mésusage des benzodiazépines - (Septembre 2012)
- Point d'information relatif à la publication de l'expertise collective de l'INSERM sur médicaments psychotropes : consommations et pharmacodépendances - (Octobre 2012)

- Point d'information relatif aux modifications des conditions de prescription et de délivrance du rivotril® (clonazépam) - (Octobre 2011)
- Clonazépam (RIVOTRIL®) per os utilisé hors AMM (notamment dans la douleur, les troubles anxieux et du sommeil) : Pourquoi et comment arrêter ? - Mise au point (15/12/2011) (203 ko) - (Décembre 2011)
- Recommandations émises par la HAS sur l'arrêt des benzodiazépines chez les sujets âgés (Octobre 2007)

- Durée maximale de prescription des médicaments classés comme hypnotiques (02/09/2002) (39 ko)
- Durée maximale de prescription des médicaments classés comme anxiolytiques (07/03/2007) (81 ko)
- Conditions de prescription et de délivrance des médicaments « assimilés stupéfiants » (07/12/2012) (111 ko)