Information destinée aux Oncologues, pharmaciens hospitaliers et pharmacies de ville **Chez l'adulte, l'ondansétron administré par voie IV est indiqué dans la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie, et dans le traitement des nausées et vomissements post-opératoires. Il entraîne un allongement dose-dépendant de l'intervalle QT corrigé pouvant être à l'origine de torsades de pointe, arythmie cardiaque pouvant menacer le pronostic vital.**

De nouvelles recommandations importantes concernant l'utilisation par voie intraveineuse de l'ondansétron à doses répétées et chez le patient âgé dans la prise en charge de la prévention et du traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie sont communiquées aux professionnels de santé.

- Ondansétron (ZOPHREN et génériques) et allongement dose-dépendant de l'intervalle QT : Mise à jour de l'information concernant la posologie de la forme pour administration intraveineuse (IV) - Lettre aux professionnels de santé (02/10/2013) (98 ko)

Lire aussi

- Ondansétron (Zophren® et génériques) et allongement dose-dépendant de l'intervalle QT. Nouvelle restriction posologique concernant l'utilisation intraveineuse (IV) - Lettre aux professionnels de santé - 02/08/2012 (02/08/2012) (38 ko)

- RCP Zophren du Répertoire des Spécialités Phamaceutiques