A l'occasion du **congrès THS** qui se déroule à **Biarritz**, sont dévoilés les **résultats RIME**, première étude
évaluant Suboxone® vs buprénorphine
chez les
patients
recourant fréquemment à l'
injection de buprénorphine
.

- En France, 150 000 patients bénéficient actuellement d'un traitement substitutif aux opiacés (TSO)1. Cette prise en charge médicale visant à réduire les risques liés à l'usage de la drogue a fait la preuve de son efficacité sur le plan socio-sanitaire depuis 1995. Toutefois, il subsiste et se développe différentes formes de mésusage de ces traitements : auto-substitution, dépendance, qui font courir à l'usager des risques sanitaires graves. - Suboxone® a été mis sur le marché en France en janvier 2012. Disponible dans 46 pays, ce traitement permet d'accompagner les patients dans la maitrise de leur dépendance, tout en minimisant le risque de mésusage du médicament.

- Pour la première fois, une étude clinique randomisée, française, a comparé l'efficacité de Suboxone® à celle de la buprénorphine, sur la réduction du mésusage du TSO par voie intraveineuse chez les patients dépendants aux opiacés déclarant s'injecter la buprénorphine au moins 4 fois par semaine et désireux d'arrêter cette pratique.

- Cette étude offre une nouvelle vision des traitements substitutifs aux opiacés et révèle que 89,6 % des patients dans le groupe Suboxone® sont parvenus à réduire leur nombre moyen d'injection/semaine d'au moins 30 % vs 45.8 % dans le groupe buprénorphine (différence significative p